



Kombinirani praški

peroralni praški
acetilsalicilna kislina/paracetamol/kofein

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

- Kaj vsebuje navodilo:**
1. Kaj je zdravilo Kombinirani praški in za kaj ga uporabljamo
 2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kombinirani praški
 3. Kako uporabljati zdravilo Kombinirani praški
 4. Možni neželeni učinki
 5. Shranjevanje zdravila Kombinirani praški
 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO KOMBINIRANI PRAŠKI IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Kombinirane praške uporabljate za lajšanje bolečin, kot so glavobol, bolečine pri poškodbah, bolečine v mišicah in sklepih (na primer revmatske bolečine). Zdravilo lahko uporabljate tudi za lajšanje bolečin in zniževanje zvišane telesne temperature pri gripi in prehladnih obolenjih. Acetilsalicilna kislina in paracetamol lajšata bolečine in znižujeta zvišano telesno temperaturo. Acetilsalicilna kislina deluje tudi protivnetno. Kofein ima spodbujevalni učinek na organizem.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO KOMBINIRANI PRAŠKI

Ne uporabljajte zdravila Kombinirani praški

- če ste alergični na acetilsalicilno kislino, druge salicilate, katero od sestavin zdravila in v primeru, če ste po jemanju podobnih zdravil (nesteroidna protivnetna in protirevmatična zdravila) že kdaj imeli preobčutljivostno reakcijo
- če imate razjede na želodcu, dvanajstniku ali črevesju, krvavitve v prebavilih (če opazite kri v blatu ali črno blato), hemofilijo ali druge motnje v strjevanju krvi (na primer nagljenost h krvavitvam), resno okvaro jeter, ledvic ali srca, porfirijo (redka presnovna bolezen), pomanjkanje encima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (redka dedna bolezen rdečih krvničk), putiko, preobčutljivost za kinidin, tinitus (zvonjenje v ušesih), vnetje vidnega živca, miastenijo gravis, hemolizo (razpad rdečih krvnih celic)
- ob zdravljenju z zdravili, ki preprečujejo strjevanje krvi
- ob zdravljenju z metotreksatom v odmerkih, višjih od 15 mg na teden
- v času nosečnosti in dojenja
- otroci, mlajši od 18 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Ob pojavu oteženega dihanja, vročine ali gnojnega izpljunka pri prehladnih obolenjih ter otekanja bolečih predelov, rdečine ali vročine pri bolečinah v mišicah in sklepih je nujen obisk zdravnika.

Posebna previdnost je potrebna ob uporabi Kombiniranih praškov pri motnjah v delovanju jeter ali ledvic, okvari kostnega mozga, Gilbertovem sindromu (redka dedna presnovna bolezen), alergijah, nosnih polipih, bronhialni astmi, kroničnem nahodu ali koprivnici (zlasti ob preobčutljivosti za druge protivnetne učinkovine, na primer acetilsalicilno kislino), vnetjih sluznice želodca ali črevesja, nenadzorovanem zvišanem krvnem tlaku, močnih menstruacijskih krvavitvah, hemolitični anemiji (slabokrvnost zaradi povečanega razpada rdečih krvnih celic), odvisnosti od alkohola, kronični podhranjenosti in dehidriranosti. Uporaba zdravila ni priporočljiva pri krvavitvah v prebavil kadarkoli v preteklosti.

Zdravila ne jemljite 7 dni pred kirurškim posegom ali po nedavnem kirurškem posegu (vključno z manjšimi posegi, na primer izdrtjem zoba).

Dolgotrajno jemanje zdravil za lajšanje glavobola lahko privede do kroničnega glavobola.

Dolgotrajno jemanje velikih odmerkov zdravil za lajšanje bolečin lahko trajno poškoduje ledvice in jetra.

Zdravilo znižuje zvišano telesno temperaturo, kar lahko prikrije okužbo.

Zdravilo lahko vpliva na rezultate testov delovanja ščitnice ter določanja inzulina, glukagona, sladkorja in sečne kisline v krvi.

Zdravilo vsebuje acetilsalicilno kislino, ki lahko zmanjša plodnost pri ženskah; učinek po prenehanju uporabe zdravila izgine.

Otroci in mladostniki

Kombiniranih praškov naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 18 let.

Druga zdravila in zdravilo Kombinirani praški

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Kombiniranih praškov ne smete jemati hkrati z drugimi zdravili, ki vsebujejo acetilsalicilno kislino ali paracetamol.

Do medsebojnega učinkovanja lahko pride ob sočasni uporabi Kombiniranih praškov z naslednjimi zdravili oziroma učinkovinami: druga nesteroidna protivnetna in protirevmatična zdravila, zdravila z učinkom na jetra, zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni (sulfonilsečnine), zdravila za zdravljenje epilepsije (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin, lamotrigin, primidon, valproat), zdravila za zdravljenje putike (benzbromaron, probenecid, sulfipirazon), zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka (zaviralci angiotenzinske konvertaze, blokatorji receptorjev za angiotenzin II), zdravila, ki raztapljajo krvne strdke ali preprečujejo strjevanje krvi (cilostazol, dipiridamol, heparin, klopidogrel, tiklopidin, varfarin in drugi derivati kumarina), zdravila za zdravljenje prebavnih motenj (domperidon, metoklopramid, propanetin), zdravila z delovanjem na sluznico prebavil, citostatiki (metotreksat, pemetreksed), antibiotiki (izoniazid, flukloksacilin, kloramfenikol, rifampicin), antacidi, antihistaminiki, peroralne kontracepcijske tablete, uspavala, aktivno oglje, anagrelid, cimetidin, deferasiroks, disulfiram, glukokortikoidi, griseofulvin, holestiramin, interferon alfa, kortikosteroidi, levotiroksin, litij, metoprolol, mifepriston, selektivni zaviralci privzema serotonina, simpatomimetiki, spironolakton, spojine zlata, teofilin, triciklični antidepresivi, verapamil, zafirlukast, zaviralci karboanhidraze, zaviralci giraze, zidovudin.

Zdravilo Kombinirani praški skupaj s hrano in pijačo

V času jemanja Kombiniranih praškov ne pijte alkoholnih pijač in omejite vnos kofeina.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ne uporabljajte Kombiniranih praškov med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Kombinirani praški vplivali na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO KOMBINIRANI PRAŠKI

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Vzamete lahko 1 prašek na 4 do 6 ur.

Največji dnevni odmerek so 4 praški.

Vsebinsko papirnate kapsule stresite v pol kozarca vode (1 dl), premešajte in popijte, najbolje po jedi.

Zdravilo jemljite največ 3 dni zapored.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Kombinirani praški, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ob zaužitju prevelikega odmerka Kombiniranih praškov se takoj posvetujte z zdravnikom, saj se znaki lahko pojavijo šele čez nekaj dni.

Znaki zaužitja prevelikega odmerka zdravila so slabost, bruhanje, pomanjkanje apetita, omotica, zaspanost, nemir, potenje, glavobol, hitro utripanje srca, prekomerno dihanje, zvonjenje v ušesih, poslabšanje sluha, zvišana telesna temperatura, motnje delovanja srca, krvavitve v prebavilih in drugi. Prvi znak okvare jeter, ki je smrtno nevarna in se pojavi po 1 do 2 dneh ali še kasneje, je trebušna bolečina.

Dolgotrajno jemanje prevelikih odmerkov zdravila lahko povzroči resno okvaro jeter ali ledvic.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kombinirani praški

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zdravniška pomoč je nujna ob pojavu naslednjih neželenih učinkov Kombiniranih praškov: pojav rdečice na koži, izpuščaje, mehurjev ali luščenja kože, krvavitve iz nosu, dlesni ali druge krvavitve, kožni izpuščaji, glavobol, omotica, zvonjenje v ušesih, poslabšanje sluha, možganska krvavitev, bolečina v trebuhu, pojav razjed na prebavilih in krvavitve iz prebavil, ki jih lahko spremljajo huda bolečina v želodcu, krvavo ali črno obarvano blato, bruhanje krvi, resne kožne reakcije (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, akutna generalizirana eksantemska pustuloza).

Zelo redek neželeni učinek je takojšnja preobčutljivostna reakcija (anafilaktična reakcija), ki je lahko tudi smrtno nevarna in zahteva takojšnjo zdravniško pomoč; kaže se kot otekanje obraza, ustnic, vratu ali grla, kar lahko povzroči težave pri požiranju ali dihanju, astmatični napad, potenje, padec krvnega tlaka, ki se stopnjuje do šoka.

Občasno se lahko pojavijo kožne preobčutljivostne reakcije (izpuščaji, rdečica, koprivnica, srbenje). Obstajajo poročila o zmanjšanju števila nekaterih vrst krvnih celic (na primer krvnih ploščic, belih in rdečih krvnih celic). Lahko se pojavijo motnje v delovanju ledvic in jeter, depresija, omotica, halucinacije, tresenje, glavobol, zamegljen vid, bolečine v trebuhu, driska, slabost, bruhanje, draženje želodčne sluznice, vnetje nosne sluznice, utrujenost, zvišana telesna temperatura, nizke koncentracije sladkorja v krvi. Znaki preobčutljivosti za kinin se kažejo tudi kot slabost, glavobol, motnje vida, bruhanje, trebušna bolečina, driska in vrtoglavica.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILO KOMBINIRANI PRAŠKI

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte na suhem mestu, pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnicini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjne odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE**Kaj vsebuje zdravilo Kombinirani praški**

1 peroralni prašek vsebuje 350 mg acetilsalicilne kisline, 250 mg paracetamola in 50 mg kofeina.

Pomožna snov: lahki magnezijev oksid (E530).

Izgled zdravila Kombinirani praški in vsebina pakiranja

Kombinirani praški so praški, bele barve.

Pakiranje je škatla, v kateri je 10 peroralnih praškov v papirnatih kapsulah, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Kombinirani praški

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 21. 9. 2020.

