

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za uporabnike. Medicinski pripomoček je na voljo brez recepta. Da vam bo kar najbolje koristil, ga uporablajte pri navedenih indikacijah.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se po določenem času simptomi še pojavljajo, se posvetujte z zdravnikom.

Cicatridina®

NATRIJEVA SOL HIALURONSKE KISLINE 0,2%
mazilo

SESTAVA

Voda, tekoči parafin, cetil-stearilni alkohol, olje sladkega mandlja, polioksietilen (2) stearilni eter, polioksietilen (21) stearilni eter, glicerin, sorbitol 70%, silikonsko olje, klorheksidin diglukonat 20%, imidazolidinil urea, natrijeva sol hialuronske kisline, dinatrijeva sol EDTA, BHT.

V KAKŠNI OBLIKI JE

V pakiranju je ena tuba mazila CICATRIDINA®, 30 g €.

KAJ JE IN KAKO SE UPORABLJA

Mazilo CICATRIDINA® učinkuje zaradi vsebnosti hialuronske kisline. To je mukopolisaharid, ki je v večjih količinah prisoten v mnogih telesnih tkivih. Hialuronska kislina pripomore k izgrajevanju tkiv tako, da jim povrne čvrstost, prožnost in elastičnost. Številne klinične študije so pokazale, da hialuronska kislina lahko pospeši in izboljša obnovo povrhnjice in celjenje tkiva.

INDIKACIJE

Dodatna pomoč pri celjenju površinskih in globokih ran kateregakoli vzroka (odrgnine, razrganine, opeklne, kirurške rane, preležanine in razjede).

KDAJ NAJ JE NE BI UPORABLJALI

V primeru individualne preobčutljivosti za katerokoli sestavino.

Nosečnost in dojenje

Varnost uporabe mazila CICATRIDINA® med nosečnostjo in dojenjem ni znana. V teh primerih je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

Vpliv na upravljanje vozil in strojev

Posebni varnostni ukrepi niso potrebeni.

MEDSEBOJNO DELOVANJE Z DRUGIMI IZDELKI

Medsebojna delovanja z drugimi izdelki niso znana, zato je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom, preden uporabite mazilo CICATRIDINA® v kombinaciji z drugimi medicinskimipripomočki ali zdravili za lokalno uporabo.

KAKO SE UPORABLJA

Pred vsako uporabo poškodovani predel skrbno očistite. Nanj nanesite mazilo z nežnim masiranjem. Po potrebi predel zaščitite z gazo. V skladu z dobro higiensko prakso si umijte roke pred uporabo medicinskega pripomočka in po njej.

KDAJ IN KAKO DOLGO

Uporabite 2- do 3-krat dnevno po predpisanih navodilih. Trajanje uporabe je odvisno od poteka simptomov; če je potrebno, je mazilo CICATRIDINA® primerno tudi za dolgotrajno uporabo.

NEŽELENI UČINKI

Uporaba kateregakoli izdelka za lokalno uporabo, posebno dolgotrajna, lahko povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom o ustrezniterapiji. Če se pojavijo neželeni učinki, ki niso opisani v teh navodilih, obvestite o tem svojega zdravnika ali farmacevta.

OPOZORILA

Shranjujte nedosegljivo otrokom! Izogibajte se stiku izdelka z očmi. Ne zaužijte izdelka.

ROK UPORABE IN SHRANJEVANJE

Rok uporabe je naveden na embalaži (EXP) in se nanaša na zaprt in pravilno hrانjen izdelek. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe, navedenega na embalaži, oziroma če je embalaža odprta ali poškodovana. Medicinski pripomoček shranjujte tesno zaprt, zaščitenpred svetlobo in toploto.

MEDICINSKI PRIPOMOČEK  0373

 Proizvajalec: FARMA-DERMA s.r.l.
Via dei Bersaglieri, 10 - 40010 Sala Bolognese (BO) - ITALIA (ITALY)

Uvoznič:
DR. GORKIĆ d.o.o.
Obrotniška 11, 1370 Logatec, SLOVENIJA