

Navodilo za uporabo

Strepsils vitamin C z okusom pomaranče pastile

amilmetakrezol/2,4-diklorobenzilalkohol/askorbinska kislina/natrijev askorbat

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste že leli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče
3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče in za kaj ga uporabljamo

Amilmetakrezol in 2,4-diklorobenzilalkohol imata antiseptične lastnosti.

Zdravilo vsebuje tudi vitamin C, ki krepi obrambne sposobnosti telesa in pripomore k hitrejši ozdravitvi.

Zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče je namenjeno za ublažitev simptomov vnetja žrela in okužb v ustih in žrelu.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

Ne uporabljajte zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

- če ste alergični na amilmetakrezol, 2,4-diklorobenzilalkohol, askorbinsko kislino, natrijev askorbat ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- pri otrocih, mlajših od 6 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če že dlje časa kašljate ali če ste hripavi, se posvetujte z zdravnikom.

Priporočenih odmerkov zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče ne smete preseči. Uporabite najmanjši učinkovit odmerek za najkrajše možno trajanje zdravljenja.

Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Druga zdravila in zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče skupaj s hrano in pijačo

Ni znano, da bi hrana in pijača vplivali na učinke zdravila.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ker ni dovolj podatkov o varnosti zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče med nosečnostjo in dojenjem, uporaba v teh obdobjih ni priporočljiva.

Podatki o vplivu zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče na plodnost niso na voljo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče vsebuje glukozo, saharozo, propilenglikol, etanol, barvili E110 in E124

Vsaka pastila vsebuje glukozo in saharozo. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

Propilenglikol lahko povzroči draženje kože in sluznice.

Zdravilo vsebuje tudi majhne količine etanola (alkohola), in sicer manj kot 100 mg na odmerek.

To zdravilo vsebuje barvili E110 in E124, ki lahko povzročita alergijske reakcije.

Alergijske reakcije so pogosteje pri ljudeh, ki so preobčutljivi za acetilsalicilno kislino.

3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek je:

Odrasli: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite eno pastilo.

Največji dnevni odmerek zdravila je 12 pastil.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Otroci, starejši od 6 let, in mladostniki: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite eno pastilo.

Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil.

Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 6 let.

Starostniki: posebno prilagajanje odmerka ni potrebno.

Neposredno po uporabi zdravila ne uživajte hrane ali pijače, da le-ta ne bi pospešila odstranjevanja zdravila z ustne sluznice in žrela.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Preveliko odmerjanje lahko povzroči želodčne in črevesne težave.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Spodnji seznam neželenih učinkov se nanaša na kratkotrajno uporabo zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče. V primeru dolgotrajnega zdravljenja kroničnih težav se lahko pojavijo dodatni neželeni učinki.

Možni neželeni učinki, ki se lahko pojavijo:

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- preobčutljivost, otekanje ust in žrela, draženje žrela, mravljinčenje v ustih, neprijeten občutek v ustih, izpuščaj

Redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- pekoča bolečina v jeziku

Zelo redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- prebavne motnje, slabost

Neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov):

- bolečina v trebuhu

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si.

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake "Uporabno do." Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče

- Zdravilne učinkovine so: amilmetakrezol, 2,4-diklorobenzilalkohol, askorbinska kislina in natrijev askorbat.
1 pastila vsebuje 0,6 mg amilmetakrezola, 1,2 mg 2,4-diklorobenzilalkohola, 33,50 mg askorbinske kisline in 74,90 mg natrijevega askorbeta, kar ustreza 66,50 mg proste askorbinske kisline.
- Druge sestavine zdravila so: levomentol, vinska kislina, aroma pomaranče (etanol in bergamotkino olje), propilenglikol, oranžno FCF (E110), rdeče 4R (E124), tekoča glukoza, tekoča saharoza.

Izgled zdravila Strepsils vitamin C z okusom pomaranče in vsebina pakiranja

Zdravilo Strepsils vitamin C z okusom pomaranče je na voljo v obliki oranžnih, okroglih pastil z okusom pomaranče in s Strepsils zaščitnim znakom "S" na obeh straneh.

Na voljo je v kartonski škatli s 24 pastilami (2 x 12 pastil v pretisnem omotu iz PVC/PVDC in aluminijaste folije).

Način izdajanja zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Reckitt Benckiser d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269D
10000 Zagreb
Hrvaška

Proizvajalca

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Thane Road, Nottingham, NG90 2DB,
Velika Britanija

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemska

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 6. 2019