

SIMAKTIV

simetikon + aktivni ugljen

20 dvoslojnih tableta s prilagođenim oslobađanjem, za oralnu primjenu

1. Naziv, sastav i namjena medicinskog proizvoda

1.1 Opis medicinskog proizvoda i način primjene

SIMAKTIV je medicinski proizvod u obliku tableta koji se koristi za ublažavanje neugodnih simptoma povezanih s gutanjem zraka i nadiranjem crijeva. Preporučuje se za liječenje simptoma kao što su nadiranje želuca ili crijeva zbog nakupljanja plinova. Ublažava s tim povezane bolove i grčeve te sprječava nadiranje i eruktaciju (podrigivanje).

1.2 Sastav

Jedna tableta sadrži:

- 50 mg simetikona
- 300 mg aktivnog ugljena

Pomoćne tvari: maltodekstrin, saharoza, mikrokristalna celuloza, hidroksipropil metil celuloza, polivinil pirolidon, koloidni silicijev dioksid, kroskarmelozanatrij, polivinilpolipirolidon, gliceril behenat, silicijev dioksid, magnezijev stearat (biljni).

1.3 Mechanizam djelovanja

Učinkovitost proizvoda posljedica je djelovanja simetikona koji uklanja pjenu iz gastrointestinalnog trakta u kombinaciji s djelovanjem aktivnog ugljena koji upija plinove; djelovanje je isključivo mehaničko.

Dvoslojna tableta otpušta približno 50% sastojaka u želucu tijekom 15 minuta, te se potpuno razgradije u crijevima tijekom jednog sata.

Komponente se ne apsorbiraju u gastrointestinalnom traktu i ne ometaju apsorpciju hranjivih tvari.

2. Sadržaj pakiranja

Jedna kutija sadrži blister s 20 dvoslojnih tableta za jednokratnu uporabu.

3. Doziranje, način i vrijeme primjene

Odrasli: 4 tablete dnevno, ako je moguće po 2 tablete nakon dva glavna dnevna obroka.

Izdavate tablete iz blistera pažljivo, da se ne slome. Tablete protujte s časom vode.

4. Poznate nuspojave

Kod uporabe u preporučenim dozama može se uočiti tamno smeda boja stolice, zbog prisutnosti aktivnog ugljena. Ova pojava potpuno je normalna i nema patološki značaj.

Nisu uočene odgodene i dugotrajne nuspojave.

Proizvod ne utječe negativno na senzorne sposobnosti (razinu pažnje, sposobnost upravljanja vozilima ili sposobnost izvođenja drugih aktivnosti).

5. Rok valjanosti i uvjeti čuvanja

Rok valjanosti naveden je na pakiranju iza oznake "EXP".

Tablete čuvajte u blistru na suhom mjestu, dalje od izravnog svjetla ili izvora topline; iz blistra izvadite samo tablete koje ćete upotrijebiti.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

6. Upozorenja i mjere opreza

- Ne koristiti u djeci mlađe od 14 godina.

• Čuvajte izvan dohvata djece.

• Ne uzimati tabletu u ležećem položaju.

• Proizvod se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blistru.

• Tablete iz oštećenog pakiranja ne smiju se koristiti.

• Svaka tableta je za jednokratnu uporabu i treba je izvaditi iz blistra neposredno prije uporabe; ne pokušavajte ponovno koristiti tablete koje su djelomično korištene (prethodno slomljene) ili su stajale izvan blistra. Nepравилно rukovanje može dovesti do onečišćenja proizvoda.

• Preporučena doza ne smije se prekoracići.

• Nemojte koristiti proizvod u slučaju poznatih želučanih ili crijevnih lezija.

• Nemojte koristiti u slučaju opstrukcije (začepljenja) crijeva.

• Nemojte uzimati proizvod kada koristite druge oralne medicinske proizvode ili lijekove: adsorpcijska moć aktivnog ugljena i simetikona može negativno utjecati na učinkovitost drugih lijekova.

• Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nego uzmete Simaktiv uz drugu terapiju koja je u tijeku.

• Simetikon može spriječiti učinak nekih reagensa koji se koriste u dijagnostici, npr. Guaiac gume.

• Proizvod je namijenjen za kontinuiranu uporabu do najviše 30 dana; ako simptomi potraju, obratite se svom liječniku.

7. Kontraindikacije

Ne preporučuje se uporaba medicinskog proizvoda u slučaju preosjetljivosti na djelatne tvari ili bilo koju od pomoćnih tvari. Nema dovoljno podataka koji opravdavaju uporabu medicinskog proizvoda u trudnoći ili za vrijeme dojenja. Tijekom trudnoće i dojenja medicinski proizvod se može koristiti samo ako je to neophodno, uz prethodno savjetovanja s liječnikom.

8. Odlaganje

Kad ste upotrijebili sve tablete ili im je istekao rok valjanosti, pakiranje i/ili proizvod treba odloziti u skladu s važećim propisima, što će pomoći očuvanju okoliša.

9. Naziv i adresa proizvođača

Novelty Technology Care S.r.l. (NTC S.r.l.)

Via Luigi Razza, 3-20124 Milano, Italija

10. Naziv i adresa ovlaštenog predstavnika

EBOR Pharma j.d.o.o.

Heinzela 62

10000 Zagreb, Hrvatska

11. Datum revizije teksta: Kolovoz, 2021.

 NTC Srl
Via Luigi Razza 3
20124 Milano, Italija



SIMAKTIV

simetikon + aktivno oglje

20 dvoslojnih tablet s prirejenim sproščanjem za peroralno dajanje

1. Ime, sestava in predviden namen medicinskega pripomočka

1.1 Opis in način dajanja

SIMAKTIV je medicinski pripomoček v obliki tablet, ki se uporablja za lajšanje neprijetnih simptomov, povezanih s požirjanjem zraka in napenjanjem.

Priporoča se za simptomatsko zdravljenje težav povezanih z napihnjenoščjo želodca ali črevesja zaradi kopicanja plinov. Lajša s tem povezane bolečine in krče ter preprečuje napenjanje in spahovanje.

1.2 Sestava

Ena tableta vsebuje:

- 50 mg simetikona
- 300 mg aktivnega oglja

Pomožne snovi: maltodekstrin, saharoz, mikrokristalna celuloza, hidroksipropilmetylceluloza, polivinilpirolidon, silicijev dioksid, natrijev karmelozat, polivinilpolipirolidon, gliceril behenat, silicijev dioksid, magnezijev stearat (rastlinski).

1.3 Mehanizem delovanja

Učinkovitost medicinskega pripomočka je posledica delovanja simetikona in aktivnega oglja.

Simetikon spremeni površino napetosti zračnih mehurčkov pene v vsebini prebavnega trakta, zato mehurčki razpadajo. Aktivno oglje absorberja nastale pline. Delovanje je izključno mehansko.

Dvoslojna tableta v 15 minutah sprosti približno 50 % sestavin v želodcu in se v celoti razgradi v črevesju v eni ur. Sestavine se ne absorbirajo v prebavilih in ne motijo absorpcije hrani.

2. Vsebina pakiranja

Ena škatla vsebuje pretisni omot z 20 dvoslojnimi tabletami za enkratno uporabo.

3. Odmerjanje, način in čas uporabe

Odrasli: 4 tablete na dan, po možnosti 2 tableti po dveh glavnih dnevnih obrokih.

Tablete previdno odstranite iz pretisnega omota, da se ne zlomijo. Tablete pogolnите s kozarcem vode.

4. Znani neželeni učinki

Pri uporabi v priporočenih odmerkih lahko zaradi prisotnosti aktivnega oglja opazimo temno rjavbo barvo blata. Ta pojav je povsem normalen in nima patološkega pomena.

Srednjeročnih in dolgoročnih neželenih učinkov niso ugotovili.

Izdelek ne vpliva negativno na čutne sposobnosti (stopnja pozornosti, sposobnost upravljanja vozil ali opravljanje drugih dejavnosti).

5. Rok uporabnosti in pogoji hrambe

Datum izteka roka uporabnosti je naveden na embalaži.

Tablete hranite v pretisnem omotu na suhem mestu, stran od neposredne svetlobe ali virov toplote; iz pretisnega omota odstranite samo tablete za uporabo.

Hranite pri temperaturi do 25 °C.

6. Opozorila in previdnostni ukrepi

- Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 14 let.

- Hranite izven dosega otrok.
- Ne jemljite tablet v ležečem položaju.
- Izdelka ne smete uporabiti po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu.
- Tablet iz poškodovane embalaže ne smete uporabljati.
- Vsaka tableta je samo za enkratno uporabo in jo je treba odstraniti iz pretisnega omota, tukaj pred uporabo; ne poskušajte ponovno uporabiti tablet, ki so bile delno uporabljene (prej zlomljene) ali so stale zunaj pretisnega omota. Nepravilno ravnanje lahko povzroči kontaminacijo izdelka.
- Priporočenega odmerka ne smete prekoračiti.
- Izdelka ne uporabljajte v primeru znanih želodčnih ali črevesnih razjed.
- Ne uporabljajte v primeru črevesne obstrukcije (zapore).
- Izdelka ne jemljite pri uporabi drugih peroralnih medicinskih pripomočkov ali zdravil: adsorpcijska moč aktivnega oglja in simetikona lahko negativno vpliva na njihovo učinkovitost.
- V primeru sočasnih farmakoloških terapij se pred jemanjem medicinskega pripomočka SIMAKTIV posvetujte s svojim zdravnikom.
- Simetikon lahko prepreči učinek nekaterih reagentov, ki se uporabljajo pri diagnostiki, na primer Guaiac gumi.
- Izdelek je namenjen neprekjeni uporabi do 30 dni; če simptomi ne prenehajo, se posvetujte z zdravnikom.

7. Kontraindikacije

Uporaba medicinskega pripomočka v primeru preobčutljivosti na katero koli sestavino ni priporočljiva.

Ni dovolj podatkov, ki bi upravičevali uporabo medicinskega pripomočka med nosečnostjo ali dojenjem. Med nosečnostjo in dojenjem je treba medicinski pripomoček uporabljati le po potrebi in po posvetovanju z zdravnikom.

8. Odstranjevanje

Ko so bile vse tablete porabljene ali jim je potekel rok uporabe, je treba embalažo in / ali izdelek odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi, kar bo pripomoglo k zaščiti okolja.

Datum revizije: avgust 2021

 NTC Srl
Via Luigi Razza 3
20124 Milano, Italija





Nome prodotto:

SIMAKTIV cpr

Cod. Componente Siit:
03009677/2

Formato aperto:
130x160mm

Formato chiuso:
130x40mm

Colori in bianca:

1 colore: Nero



Black

Colori in volta:

1 colore: Nero



Black