

IALUXID

GEL

Indikacije: Nanesen gel na prizadeti koži tvori zaščitno plast pred zunanji povzročitelji bakterijske okužbe in okužbo tudi preprečuje. Sestava IALUXID GEL-a vpliva na mikrookolje prizadete kože, zato se uporablja pri aknah (mozoljavosti), folikulitisu (gnojnem vnetju lasnega mešička), paronihiji (gnojnem vnetju ob nohtu - zanohtnici) in impetigu (gnojnem vnetju kože - krastavosti).

Navodila za uporabo: Pred uporabo izdelka si temeljito umijte roke in očistite kožo; uporabite potrebno količino gela, da enakomerno prekrijete prizadeto mesto. Po potrebi gel nanesite večkrat dnevno.

Sestava: voda, vodikov peroksid, karbomer, ksantan gumi, hidroksietil akrilat/kopolimer natrijevega akriloidimetil taurata, skvalen, glicin, natrijev hialuronat, polisorbitat 60, oksikvinolin sulfat.

Samo za zunanjo uporabo. Ne sme priti v stik z očmi.

Kontraindikacije, previdnostni ukrepi in opozorila: IALUXID GEL je kontraindiciran pri uporabnikih z znano predhodno preobčutljivostjo za katerokoli od sestavin.

Če izdelek pride v stik z očmi, takoj izpirajte z obilno količino mrzle vode.

Ne uporabljajte na ranah z ne odstranjenimi šivi.

Shranjujte nedosegljivo otrokom. Shranjujte v suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno vročino.

Shranjujte pri sobni temperaturi do 25 °C. Po uporabi zaprite tubo.

Rok uporabe se nanaša na nepoškodovan in pravilno hranjen izdelek.

Neželeni učinki: Uporabniki gel dobro prenašajo, kljub temu se po nanosu lahko pojavita pekoč občutek in blaga rdečica. Pri okuženih ranah se posvetujte z zdravnikom zaradi dodatnega lokalnega ali sistemskega antibiotičnega zdravljenja. Ob neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

CE 0373 010309

Rev3, Februar 2013

EC REP BMG Pharma s.r.l.
Via Confalonieri 29, Milano, Italija



BMG Pharma LLC
824 Highway 88, Gardnerville, NV 89460, ZDA

Distributer: DR. GORKIČ d.o.o.
Obrtniška 11, 1370 Logatec, Slovenija

