

Borvazelin

mazilo

borova kislina

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.

Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo, se posvetujte z zdravnikom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo vsebuje:
1. Kaj je Borvazelin in za kaj ga uporabljamo
 2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili Borvazelin
 3. Kako uporabljati Borvazelin
 4. Možni neželeni učinki
 5. Shranjevanje Borvazelina
 6. Dodatne informacije

1. KAJ JE BORVAZELIN IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Borvazelin uporabljajte pri blažjih vnetjih kože in površinskih glivičnih obolenjih kože. Borova kislina deluje protibakterijsko in protiglivično.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI BORVAZELIN

Ne uporabljajte Borvazelina

Ne uporabljajte Borvazelina, če ste preobčutljivi za katerikoli sestavino zdravila ter pri otrocih, mlajših od 3 let.

Pri uporabi Borvazelina bodite posebno pozorni

Če se vam stanje ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom.

Posvet z zdravnikom je nujen ob pojavu znakov hujše okužbe kože. Borvazelina ne nanašajte na poškodovano kožo.

Borvazelin ne sme priti v stik z očmi in sluznicami; če se to zgodi, izpirajte prizadete predele z veliko količino mlačne vode.

Izogibajte se dolgotrajni uporabi Borvazelina na večjih površinah kože.

Samo za zunanjo uporabo!

Jemanje drugih zdravil

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerikoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Borvazelina z drugimi zdravili na prizadeti predel kože.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerikoli zdravilo.

Ni podatkov o varnosti uporabe Borvazelina med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Borvazelin vplival na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI BORVAZELIN

Pri uporabi zdravila natančno upoštevajte navodila za uporabo. Če ste negotovi, se posvetujte s farmacevtom.



Borvazelin nanosite dvakrat do trikrat dnevno v tankem sloju na prizadeti predel kože.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek Borvazelina, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek Borvazelina, kot bi smeli, kožo temeljito sperite s tekočo vodo.

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja Borvazelina.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste pozabili uporabiti Borvazelin

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi Borvazelin neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

V posameznih primerih se lahko pojavijo kožne preobčutljivostne reakcije ali draženje kože.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE BORVAZELINA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Borvazelin ne smete uporabljati po izteku roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:« Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila, ki jih ne potrebujete, zbirajte ločeno od ostalih odpadkov. O načinu odstranjevanja zdravil se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje Borvazelin

Zdravilna učinkovina:

1 g mazila vsebuje

30 mg borove kisline (Acidum boricum).

Pomožna snov: beli vazelin.

Izgled Borvazelina in vsebina pakiranja

Borvazelin je mazilo, bele barve.

Pakiranje je škatla z aluminijasto tubo, v kateri je 20 g mazila, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje Borvazelina

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Borvazelin je galenski izdelek.

Proizvajalec

Gorenske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenske-lekarne.si

Navodilo je bilo odobreno 8.1.2019.

