



Kapljice za ledvice in mehur

peroralne kapljice, raztopina

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 4 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Kapljice za ledvice in mehur in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kapljice za ledvice in mehur
3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice za ledvice in mehur
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kapljice za ledvice in mehur
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO KAPLJICE ZA LEDVICE IN MEHUR IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Kapljice za ledvice in mehur uporabljajte pri blažjih okužbah sečil. Lajšajo znake, kot sta pekoč občutek med uriniranjem in pogosto uriniranje.

To je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.

Peroralne kapljice vsebujejo tekoči ekstrakt zeli njivske preslice, korenin pravega peteršilja, listov vednozelenega gornika, korenin navadnega gladeža in listov breze. Listi vednozelenega gornika vsebujejo arbutin - ta se v urinu pretvori v hidrokinon, ki deluje protibakterijsko. Učinkovine listov vednozelenega gornika in breze, zeli njivske preslice ter korenin pravega peteršilja in navadnega gladeža povečujejo izločanje urina ter tako izpirajo sečne poti.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO KAPLJICE ZA LEDVICE IN MEHUR

Ne uporabljajte zdravila Kapljice za ledvice in mehur

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila
- če imate hujša obolenja srca ali ledvic, ko je zaradi zastajanja vode v telesu priporočljiv zmanjšan vnos tekočine
- v času nosečnosti in dojenja
- otroci, mlajši od 12 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 4 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Ob pojavu vročine, bolečega uriniranja, krčev ali krvi v urinu je nujen obisk zdravnika.

Pri moških je ob pojavu kakršnih koli težav z izločanjem urina, tudi če so blažje, nujen posvet z zdravnikom, ki izključi možnost morebitnega obolenja prostate.

Kapljice za ledvice in mehur lahko povzročijo zelenkastorjavo obarvanje urina, ki po prenehanju uporabe izgine.

Zdravljenja ne ponovite več kot petkrat letno brez posveta z zdravnikom.

Pri obolenjih sečil zagotovite povečano količino urina z zadostnim vnosom tekočine v času zdravljenja.

Otroci in mladostniki

Kapljic za ledvice in mehur naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 12 let.

Druga zdravila in zdravilo Kapljice za ledvice in mehur

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Zdravila, ki povišajo kislost urina, lahko zmanjšajo učinkovitost Kapljic za ledvice in mehur.

Zdravilo Kapljice za ledvice in mehur skupaj s hrano in pijačo

Ni priporočljiva sočasna uporaba Kapljic za ledvice in mehur s hrano, pijačo in vitaminom C, ki povišajo kislost urina, ker lahko zmanjšajo učinkovitost zdravila. V času zdravljenja zaužijte veliko nekislega sadja in zelenjave ter čim manj mesa in mlečnih izdelkov.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ne uporabljajte Kapljic za ledvice in mehur med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ob jemanju priporočenih odmerkov Kapljic za ledvice in mehur ni pričakovati vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Kapljice za ledvice in mehur vsebuje etanol

To zdravilo vsebuje 70 vol % etanola (alkohola), to je do 535 mg alkohola na odmerek, kar ustreza 13,3 ml piva oziroma 5,6 ml vina na odmerek. Škodljivo je za tiste, ki trpijo za alkoholizmom. Na vsebnost alkohola morajo biti pozorne nosečnice in doječe matere, otroci in skupine z velikim tveganjem, kot so bolniki z jetrnimi obolenji ali epilepsijo.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO KAPLJICE ZA LEDVICE IN MEHUR

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Vzemite trikrat dnevno po 20 do 30 kapljic. Kapljice nakapajte v pol kozarca vode in popijte. Zdravilo jemljite, dokler znaki obolenja popolnoma ne izginejo, vendar ne dlje kot 2 tedna.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Kapljice za ledvice in mehur, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje Kapljic za ledvice in mehur lahko povzroči znake alkoholiziranosti.

Količina alkohola pri prevelikem odmerjanju lahko spremeni učinke drugih zdravil. Lahko tudi zmanjša sposobnost vožnje ali upravljanja s stroji.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kapljice za ledvice in mehur

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Kapljice za ledvice in mehur lahko predvsem pri osebah z občutljivim želodcem povzročijo draženje želodca s slabostjo, bruhanjem, drisko in bolečinami v želodcu. Zelo redko se lahko pojavijo tudi driska ali preobčutljivostne reakcije, na primer srbenje, izpuščaji, koprivnica, alergijsko vnetje nosne sluznice, otekanje obraza.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA KAPLJICE ZA LEDVICE IN MEHUR**Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!**

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Po uporabi stekleničko takoj dobro zaprite.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE**Kaj vsebuje zdravilo Kapljice za ledvice in mehur**

1 ml peroralnih kapljic, raztopine (32 kapljic) vsebuje tekoči ekstrakt zeli njivske preslice (*Equisetum arvense* L., herba), korenin pravega peteršilja (*Petroselinum crispum* (Mill.) Nym. ex A.W. Hill., radix), listov vednozelenega gornika (*Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng., folium), korenin navadnega gladeža (*Ononis spinosa* L., radix) in listov breze (*Betula species*, folium), ki ustreza 91 mg zeli njivske preslice, 91 mg korenin pravega peteršilja, 73 mg listov vednozelenega gornika, 37 mg korenin navadnega gladeža in 37 mg listov breze. Ekstrakcijsko topilo: 70-odstotni etanol.

Pomožne snovi: etanol, prečiščena voda.

Izgled zdravila Kapljice za ledvice in mehur in vsebina pakiranja

Kapljice za ledvice in mehur so bistra, zelenorjava tekočina, značilnega vonja po zeliščih.

Pri tekočih zdravilih rastlinskega izvora lahko nastane med shranjevanjem rahla usedlina.

Pakiranje je škatla s kapalno stekleničko, v kateri je 50 ml peroralnih kapljic, raztopine, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Kapljice za ledvice in mehur

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarnе, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 1. 2021.



gorenjske lekarnе