

NAVODILO ZA UPORABO

Saridon 250 mg/150 mg/50 mg tablete paracetamol/propifenazon/kofein

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Saridon in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Saridon
3. Kako jemati zdravilo Saridon
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Saridon
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO SARIDON IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Saridon je kombinacija protibolečinskih (analgetičnih) in protivročinskih (antipiretičnih) učinkovin in majhne količine kofeina. Njegove sestavine so skrbno uravnotežene in zagotavljajo hitro in učinkovito ublažitev bolečine, ki traja nekaj ur.

Zdravilo Saridon uporabljamo za lajšanje bolečin, kot so glavobol, zobobol, menstrualne bolečine, pooperacijske in revmatske bolečine ter za lajšanje bolečin in zniževanje zvišane telesne temperature pri prehladu in gripi.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO SARIDON TABLETE

Ne jemljite zdravila Saridon, če:

- ste alergični (preobčutljivi) na paracetamol, acetilsalicilno kislino, propifenazon (ali druge pirazolone), kofein ali katerikoli sestavino zdravila Saridon,
- imate prirojeno pomanjkanje glukoze-6-fosfat-dehidrogenaze (pri hemolitični anemiji),
- imate akutno jetrno porfirijo (motnja v presnovi porfirina),
- ste noseči ali dojite.

Zdravila Saridon ne smemo dajati dojenčkom in otrokom do 12. leta starosti.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Saridon:

- če imate okvaro jeter (npr. bolniki s hepatitisom ali alkoholiki),
- če imate motnje v delovanju ledvic,
- če imate pomanjkanje glukuronil transferaze (Gilbertov sindrom),
- če imate okvaro kostnega mozga,

- če imate astmo, kronični nahod ali koprivnico, zlasti če ste preobčutljivi za druge protivnetne učinkovine.

Dolgotrajno jemanje analgetikov (za zdravljenje glavobola) lahko privede do kroničnega glavobola. V redkih primerih lahko dolgotrajno jemanje zdravil proti bolečinam, ki vsebujejo paracetamol, trajno poškoduje ledvice in jetra.

Zdravilo Saridon znižuje telesno temperaturo, kar lahko prikrije okužbo.
Ne uživajte alkoholnih pijač, če jemljete analgetike, kot je zdravilo Saridon.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

To je še posebno pomembno, če jemljete:

- uspavala,
- zdravila za zdravljenje epilepsije (npr. fenobarbital, fenitoin in karbamazepin),
- antibiotik rifampicin,
- antibiotik kloramfenikol,
- zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje nekaterih črevesnih motenj (propantelin) ali propulzive, ki stimulirajo motiliteto črevesa (npr. metoklopramid),
- zdravila proti strjevanju krvi (varfarin ali derivati kumarina),
- zdravila za zdravljenje aidsa (zidovudin),
- peroralna kontracepcijska sredstva (peroralne kontracepcijske tablete),
- pomirjevala iz skupine barbituratov,
- zdravila za zdravljenje preobčutljivostnih reakcij (antihistaminike),
- ščitnični hormon tiroksin,
- zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje razjede na želodcu in dvanajstniku (cimetidin),
- zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje zasvojenosti z alkoholom (disulfiram),
- če kadite (kajenje namreč pospeši presnovo kofeina),
- zaviralce giraze (antibiotiki sintetičnega izvora),
- teofilin in/ali simpatikomimetike (zdravila za zdravljenje astme).

Jemanje zdravila Saridon skupaj s hrano in pijačo

Saridon tablete lahko vzamete kadarkoli. Tableto pogoltnite celo z zadostno količino tekočine (npr. s kozarcem vode). Ne uživajte alkoholnih pijač, če jemljete analgetike, kot je zdravilo Saridon.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Ustreznih podatkov o uporabi zdravila Saridon pri nosečnicah ni, zato se zdravilo Saridon v času nosečnosti ne sme uporabljati.

Ne uporabljajte zdravila Saridon, če dojite.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Saridon ne vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Saridon

Zdravilo Saridon vsebuje formaldehid, kar lahko povzroči želodčne motnje in drisko.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO SARIDON

Pri uporabi zdravila Saridon natančno upoštevajte navodilo za uporabo. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Običajni odmerki so navedeni spodaj.

Odrasli:

Vzemite 1 do 2 tableti naenkrat, največ 3-krat v 24 urah, če je treba.

Mladostniki od 12. do 18. leta:

Vzemite 1 tableto največ 3-krat v 24 urah, če je treba.

Bolnikov z okvaro ledvic ali jeter:

enkratni odmerek: 1 tableta, največji odmerek: 3 tablete.

Tableto pogoltnite celo z zadostno količino tekočine (npr. s kozarcem vode).

Zdravilo Saridon lahko jemljete največ 7 dni. Če vaše težave ne minejo, se posvetujte s svojim zdravnikom. Analgetikov ne smete jemati dalj časa ali v odmerkih, ki so večji od priporočenih, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.

Dojenčki in otroci mlajši od 12 let ne smejo prejemati zdravila Saridon.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Saridon, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Preveliki odmerki lahko povzročijo predvsem slabost, bruhanje, hitro utripanje srca in jetrno okvaro, ki je lahko usodna.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Saridon

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Saridon neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki so navedeni po naslednjem sistemu pogostnosti:

Zelo pogosti: pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov

Pogosti: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov

Občasni: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov

Redki: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov

Zelo redki: pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov

Neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Poročali so o naslednjih neželenih učinkih:

Občasni: alergijske reakcije, ki se kažejo kot kožni izpuščaj ali koprivnica.

Zelo redki: preobčutljivostne reakcije s simptomi, kot so srbenje, rdečina, koprivnica, in nenaden pojav oteklin predvsem na obrazu, ustih, očeh ali v žrelu, kar lahko povzroči težave pri požiranju in/ali dihanju ter astma.

Neznana pogostnost: takojšnja preobčutljivostna reakcija, ki je lahko tudi huda in smrtno nevarna, zmanjšanje števila nekaterih vrst krvnih celic (krvnih ploščic ali belih krvnih celic) ali vseh vrst krvnih celic.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA SARIDON

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila Saridon ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Saridon

Zdravilne učinkovine so paracetamol, propifenazon in kofein. Ena tableta vsebuje 250 mg paracetamola, 150 mg propifenazona in 50 mg kofeina.

Pomožne snovi so mikrokristalna celuloza (E460), hipromeloza (E464), formaldehid kazein, koruzni škrob, smuvec (E553b), magnezijev stearat (E572) in brezvodni koloidni silicijev dioksid.

Izgled zdravila Saridon in vsebina pakiranja

Bele, okrogle tablete z napisom Saridon na eni strani in razdelilno zarezo na drugi.

Razdelilna zareza je namenjena delitvi tablete za lažje požiranje in ne delitvi na enaka odmerka.

Zdravilo je na voljo v škatli z 10 tabletami.

Način izdaje zdravila Saridon

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Bayer d.o.o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana

Izdelovalec

Bayer Santé Familiale, 33, rue de L'industrie, 74240 Gaillard, Francija

Navodilo je bilo odobreno

11. 06. 2010