



Hipermangan

prašek za raztopino za kopel
kalijev permanganat

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Hipermangan in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Hipermangan
3. Kako uporabljati zdravilo Hipermangan
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Hipermangan
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO HIPERMANGAN IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Raztopino Hipermangana uporabljajte za čiščenje ran, razjed in ognojkov. V obliki kopeli ali obkladkov jo lahko uporabite tudi pri ekcemih, glivičnih obolenjih kože in akutnih kožnih vnetjih, predvsem v primerih, ko je prišlo do naknadne bakterijske okužbe.

Hipermangan vsebuje kalijev permanganat, ki na površini kože sprošča kisik, zaradi česar deluje protimikrobno. Pospešuje tudi celjenje vnete ali poškodovane kože.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO HIPERMANGAN

Ne uporabljajte zdravila Hipermangan

- če ste alergični na kalijev permanganat.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Pri rokovanju s Hipermanganom uporabljajte rokavice. Raztopina Hipermangana lahko začasno obarva kožo, tkanine in keramiko. Povzroči lahko tudi obarvanje nohtov, zato jih pred pripravo kopeli ali obkladkov za roke in noge zaščitite z mastnim negovalnim mazilom. Zdravilo ni primerno za izpiranje nožnice. Zdravilo ne sme priti v stik z očmi in sluznicami; če se to zgodi, prizadete predele izpirajte z veliko količino mlačne vode.

Samo za zunanjo uporabo!

Otroci in mladostniki

O uporabi Hipermangana pri otrocih se posvetujte z zdravnikom.

Druga zdravila in zdravilo Hipermangan

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Hipermangana z drugimi zdravili.

Odsvetujemo sočasno nanašanje Hipermangana in drugih zdravil na prizadeti predel.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ni podatkov o varnosti uporabe Hipermangana med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Hipermangan vplival na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO HIPERMANGAN

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Nekaj kristalčkov Hipermangana raztopite v 1 litru neoporečne pitne vode, da nastane rahlo rožnato obarvana raztopina. Raztopina za kopel lahko vsebuje največ 0,1 g Hipermangana na 10 litrov vode, raztopina za obkladke pa največ 1 g Hipermangana na 10 litrov vode! Sveže pripravljeno raztopino uporabite za izpiranje prizadetega predela kože oziroma pripravo kopeli ali obkladkov. Kopel ali obkladke izvajajte 10-15 minut.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Hipermorgan, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Uporaba raztopine Hipermorganana, ki vsebujejo visoko koncentracijo kalijevega permanganata, ali neposreden stik kristalov kalijevega permanganata s kožo lahko povzročita razjede tkiva in hudo draženje kože, ki ga spremljajo bolečina, rdečina ter opekline.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, kožo temeljito sperite s tekočo vodo.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Hipermorgan

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Hipermorgan lahko povzroči blago draženje kože, suho kožo, začasno rjavo obarvanje kože in otrditev zunanjšega sloja kože.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA HIPERMANGAN

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Plastenko shranjujte tesno zaprto za zagotovitev zaščite pred vlago.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE**Kaj vsebuje zdravilo Hipermorgan**

Prašek za raztopino za kopel vsebuje kalijev permanganat.

Pomožne snovi niso dodane.

Izgled zdravila Hipermorgan in vsebina pakiranja

Hipermorgan je kristalni prašek, temno vijolične ali skoraj črne barve, kovinskega sijaja.

Pakiranje je škatla s plastenko, v kateri je 10 g praška za raztopino za kopel, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Hipermorgan

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 28. 4. 2021.

